



DIVERSIFIKASI METODE FERMENTASI PEMBUATAN BAWANG HITAM (Black Garlic) TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN ORGANOLEPTIK PADA UKM N'UP PRODUK

by OKTAVIANUS RAJA

Submission date: 25-Jun-2021 04:30AM (UTC-0700)

Submission ID: 1607907385

File name: OKTAVIANUS_RAJA.docx (56.19K)

Word count: 1212

Character count: 7752

DIVERSIFIKASI METODE FERMENTASI PEMBUATAN BAWANG HITAM (*Black Garlic*) TERHADAP KUALITAS KIMIADAN ORGANOLEPTIK PADA UKM NUP PRODUK

RINGKASAN

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses fermentasi dan lama waktu fermentasi terhadap kualitas bawang hitam. Penelitian menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Faktorial (RAF) yang terdiri dari dua metode yaitu fermentasi dan lama waktu fermentasi. Lama waktu fermentasi dimulai dari 6, 10 sampai 14 hari. Parameter yang diamati yaitu kuantitas dan kualitas kimia seperti kadar air, protein, lemak dan organoleptik yang meliputi aroma, warna, rasa dan tekstur. Hasil pengamatan organoleptik dianalisis menggunakan software *Co-Stat* yang merupakan analisa keragaman pada taraf nyata 5%. Dan selanjutnya akan diuji kembali menggunakan uji BNT apabila ditemukan beda nyata. Hasil menunjukkan bahwa metode lama waktu fermentasi memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar air, protein dan lemak, serta sifat sensori aroma, warna, rasa dan tekstur. Proses pembuatan bawang hitam membutuhkan lama waktu fermentasi selama 14 hari. Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan terhadap metode fermentasi dan lama fermentasi sangat nyata ($\alpha=0,05$) yaitu dengan menggunakan *electric rice cooker* yang tepat selama 14 hari dan didapatkan kadar air sebanyak 9,41 serta didapatkan kadar protein tinggi sebanyak 6,91 dan kadar lemak sebanyak 0,31.

Kata kunci : Bawang putih tunggal, Lama waktu Fermentasi dan Kualitas Bawang Hitam

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bawang hitam merupakan hasil olahan proses fermentasi bawang putih tunggal yang mengalami proses pemanasan pada suhu yang telah ditentukan dengan tingkat kelembaban antara 70-85% selama kurang lebih satu bulan (Wang *et al*, 2010). Bawang hitam berpotensi terutama sebagai flavouring agent. Karena bawang hitam memiliki komponen volatil dengan beragam diskripsi ordo. Adapun beberapa diskripsi odor dari bawang hitam tersebut adalah meat, dark cocholate, honey-Like, almond, sweet, caramel dan citrus-like (Jeon *et al*, 2012). Disamping Laporan penelitian Lee *et al*, (2009) menyatakan, konsumsi bawang hitam berpengaruh nyata dapat menurunkan hepatic thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), meningkatkan aktivitas enzim superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) dan untuk pencegahan komplikasi diabetes tipe 2. S-allyl-cistein (SAC) merupakan golongan senyawa asam amino yang memiliki kandungan sulfur utama pada manfaat bawang putih tunggal, serta memiliki sifat neurotropic dan antikanker. Jumlah SAC dalam bawang hitam yaitu sebanyak 1,5 mg/kg. Bawang hitam juga memiliki kandungan senyawa lain seperti flavonoid, polifenol, dan senyawa lain yang bermanfaat untuk kesehatan.

Bawang hitam memiliki tekstur yang ringan hal ini dikarenakan berkurangnya kadar air, selain itu mempunyai aroma dan rasa yang tidak menyengat dibandingkan bawang putih tunggal. Bawang hitam sering digunakan sebagai bahan masakan, khususnya dalam masakan Asia, yaitu dengan proses memanggang seluruh umbi bawang putih tunggal (*Allium sativum*) selama beberapa minggu sehingga proses tersebut akan menghasilkan warna hitam. Pada proses pembuatan bawang hitam sering disebut sebagai proses yang menggunakan metode fermentasi, namun bawang hitam tidak melibatkan bantuan mikroba, melainkan dengan cara alamiah, yang dimana bawang putih tunggal disimpan dalam suatu tempat yang telah terkontrol dengan baik tingkat kelembapannya yaitu pada suhu tertentu selama 14-42 hari.

Kemper (2000) menyatakan bahwa perbedaan rasa dan aroma yang berbeda antara bawang putih tunggal dengan bawang putih biasa yaitu bawang putih tunggal memiliki rasa yang lebih pedas dan aroma yang khas dibandingkan bawang putih biasa. Aroma khas yang terdapat pada bawang putih tunggal berasal dari zat aktif utama yaitu *alliin*. Ketika senyawa *alliin* bereaksi dengan enzim *allinase* dan minyak atsiri yang dihasilkan dari umbi bawang putih sehingga menghasilkan aroma yang khas. Bawang putih tunggal banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan yaitu sebagai bahan obat hipertensi, diabetes mellitus, stroke dan asma (Suriana 2011).

Bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat khususnya untuk kesehatan, namun jika dikonsumsi terlalu banyak akan membuat beberapa orang yang mengkonsumsinya menjadi tidak nyaman. Hal tersebut disebabkan karena

bawang putih tunggal mengandung senyawa organosulfur sehingga menghasilkan aroma dan rasa yang menyengat. Beberapa tahun terakhir, terdapat berbagai metode pengolahan bawang putih mentah untuk menghilangkan aroma dan rasa yang menyengat yaitu dengan metode fermentasi dan proses pemanasan yang dilakukan dalam waktu yang cukup lama, sehingga nantinya akan menghasilkan citarasa yang manis serta meningkatkan kualitas bawang putih tunggal (Li *et al.* 2014).

Salah satu produk hasil olahan bawang putih tunggal yaitu bawang hitam atau *black garlic*. Pada proses pengolahannya menjadi bawang hitam, bawang putih tunggal ditempatkan pada suhu tinggi yang dijaga kelembabannya selama 60-90 hari tanpa adanya bahan tambahan. Melalui proses pengolahan tersebut, senyawa S-alil-L-sistein yang terdapat dalam bawang hitam meningkat hingga lima kali lipat dibandingkan bawang putih tunggal (Wang *et al.* 2010). Aktivitas superoksidadismutase (SOD), scavenging activity melawan hidrogen peroksida dan kandungan antioksidan dalam bawang hitam masing-masing meningkat 13 kali lipat lebih dari 10 kali lipat, dan 7 kali lipat dibandingkan dengan bawang putih biasa (Sato *et al.* 2006). Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa bawang hitam memiliki beberapa manfaat kesehatan, salah satunya yaitu kandungan antioksidan yang lebih tinggi dari bawang putih tunggal.

Pembuatan bawang hitam beberapa tahun terakhir ini telah diproduksi oleh beberapa UKM di kota Batu salah satunya yaitu oleh-oleh khas kota Batu. Metode fermentasi bawang hitam yang dilakukan hanya menggunakan *electric rice cooker* sehingga pengembangan produksinya terbatas. Pembuatan bawang hitam dengan menggunakan *electric rice cooker* dipilih karena penggunaan *electric rice cooker* sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan kepraktisan serta kemudahannya, namun informasi reaksi malliard dari bawang hitam selama waktu pemanasan masih terbatas. Oleh karena itu perlu digali informasi mengenai reaksi malliard. Proses pengolahan bawang hitam dengan cara *electric rice cooker* selama waktu pemanasan diantaranya meliputi warna, kadar air, pH, gula reduksi, asam amino bebas dan potensi antioksidannya.

Peluang UKM untuk meningkatkan kapasitas produksi bawang hitam sangatlah terbuka, mengingat Kota Batu merupakan salah satu sentra budidaya bawang putih lokal dari 4 kota di Jawa Timur. Hal ini disebabkan karena karakteristik iklim yang mendekati subtropis dengan tanah yang kering sesuai untuk pengembangan bawang putih. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian diversifikasi metode fermentasi bawang hitam yang memungkinkan bagi UKM untuk mengimplementasikan dalam memproduksi bawang hitam yang lebih efektif dan maksimal. Diversifikasi metode fermentasi yang dapat dilakukan misalnya dengan *electric drying* dan *electric rice cooker*. Hasil dari penelitian pendahuluan menyatakan bahwa bawang hitam (*black garlic*) memiliki banyak manfaat, diantaranya sebagai berikut: mengatasi kanker, tumor, miomi, mengobati kolesterol dan tekanan darah tinggi, membersihkan darah dan

sebagai anti toxin, membantu menyehatkan badan, mencegah stroke dan serangan jantung, membuang logam berat dalam tubuh seperti merkuri, membantu penderita diabetes dengan mengontrol kadar gula dan meningkatkan insulin.

6

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh metode fermentasi dan lama waktu fermentasi terhadap penentuan kadar air, protein, lemak dan karbohidrat yang meliputi aroma, warna, rasa dan tekstur".

1.3. Tujuan Penelitian

Mendapatkan kombinasi perlakuan metode dan lama fermentasi yang tepat dalam pembuatan bawang hitam yang mempunyai kadar air, protein tinggi, lemak dan sense rasa, aroma, tekstur dan warna yang disukai.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti dan akademisi
Menambah khasanakeilmuan bagi peneliti dalam proses pembuatan bawang hitam, metode fermentasinya, dan hasil uji parameternya.
2. Bagi UKM dan masyarakat
Hasil penelitian ini, memberikan informasi cara pembuatan bawang hitam yang berkualitas, sehingga mempunyai nilai ekonomis yang tinggi bagi pemerintah, menambah kekayaan produk unggulan khas daerah dari bahan lokal, yang dapat dijadikan sebagai bahan flavor agent dan biofarmasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.
3. Menambah wawasan bagi para pembaca mengenai kajian tentang bawang putih tunggal yang difermentasi menjadi bawang hitam secara alami.
4. Dapat menjadi pengetahuan baru tentang fermentasi bawang putih tunggal menjadi bawang hitam serta dapat menjadi motivasi untuk penelitian berikutnya.



DIVERSIFIKASI METODE FERMENTASI PEMBUATAN BAWANG HITAM (Black Garlic) TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN ORGANOLEPTIK PADA UKM N'UP PRODUK

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unpas.ac.id

Internet Source

5%

2

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

2%

3

www.litbang.pertanian.go.id

Internet Source

2%

4

docobook.com

Internet Source

1%

5

eprints.umm.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.nscpolteksby.ac.id

Internet Source

1%

7

Submitted to Boston University

Student Paper

%

ebookinga.com





Internet Source

1%

10

eprints.unram.ac.id

Internet Source

1%

11

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

12

ejournal.kemenperin.go.id

Internet Source

1%

13

id.123dok.com


Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



DIVERSIFIKASI METODE FERMENTASI PEMBUATAN BAWANG HITAM (Black Garlic) TERHADAP KUALITAS KIMIA DAN ORGANOLEPTIK PADA UKM N'UP PRODUK

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

